

KOVÁCS, GY.:

A *Cepaea nemoralis* /L./ faj új lelőhelye Magyarországon - Ein neuer Fundort von *Cepaea nemoralis* /L./ in Ungarn

Alföldi gyűjtéseim során Orosházán a szegedi út melletti temetőben, embertől kevésbé háborgatott bokros - bozótos területen a *Cepaea nemoralis* jelentős populációjára bukkantam. Tekintve, hogy a faj eddig ismert legkeletibb magyarországi elterjedését a Dunántulon a Gönyü-Mohács által összekötött egyenesek képezik vázlatosan, feltűnő itteni előfordulása. Feltehetően petéit virágokkal terjesztették el. Mivel a faj megtalálta a számára megszokott környezeti feltételeket, - a Dunántulon is hasonló biotópokban gyűjtöttem - az adott szűk élőhelyen elterjedt, amit az előkerült számos élő példány /60 db/ is bizonyít. Megemlítem, hogy Békés megyei gyűjtéseim során máshol eddig nem találtam. A faj cönózisának tagjai: *Cochlicopa lubricella*, *Vallonia pulchella*, *Vallonia costata*, *Chondrula tridens*, *Oxychilus draparnaudi*, *Monacha cartusiana*, *Cepaea vindobonensis*, és a *Helix pomatia*.

ZUSAMMENFASSUNG

Cepaea nemoralis /L./ kommt im Friedhof /an der Strasse nach Szeged/ von Orosháza vor. Die Art ist vermutlich eingeschleppt worden.

IRODALOM

PINTÉR, I./1962/: Beiträge zur Verbreitung der Schnecken-gattung *Cepaea* in Ungarn. Opusc.Zool.Bp.IV; 2-4:121-125.